




# PRESENTACIÓN ESTUDIO HAYA

28 DE ENERO DE 2009

Hábitos  
Anticonceptivos  
y Aborto


## Tasa de IVE en varios España



ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## Tasa de IVE en varios países



Fuente: Sedgh G International Family Planning Perspectives, 2007, 33(3):106-116  
(Guttmacher Institute)



ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



# Objetivo principal

Conocer:

- Historial anticonceptivo
- Situación anticonceptiva previa
- Decisión anticonceptiva posterior

de aquellas mujeres que van a someterse a una IVE



ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



# Diseño

Estudio epidemiológico, de corte transversal, multicéntrico.

## **Criterios de inclusión**

- ★ Cualquier mujer que acuda para I.V.E. independientemente de su edad y de su nacionalidad.
- ★ Podrán incluirse mujeres extranjeras siempre y cuando residan en España (ya sea de forma legal o ilegal).

## **Criterios de exclusión:**

- ★ Abortos debidos a malformaciones fetales.
- ★ Mujeres residentes fuera de España.



# Diseño

## Metodología

- ★ Tamaño muestral 1600-1700 mujeres
- ★ Reclutamiento competitivo para recuperar los casos de otras clínicas que hayan reclutado menos mujeres.

## Ámbito

Selección de los centros teniendo en cuenta aquellas CCAA con tasas de I.V.E. por encima de la media nacional y dentro de estas, se han optado por los centros más representativos por su volumen asistencial.

Isadora, DATOR, Clínica SUR, Tutor Médica, Isadora, El Bosque, Mediterranea Médica, Belladona y Almozara / ACTUR



# Plan de actuación

- ★ Reclutamiento

Inicio: Enero 2007

Tiempo de reclutamiento: 3 meses

Única entrevista.


- ★ CRD:

Base de datos informática a cumplimentar por investigador




# DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Tamaño muestral 2475 mujeres



IVE tasas por 1000 mujeres España 2007.



	mediana	max-min
Edad (a)	26	(13-49)
nº embarazos	1,00	




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

¿Convive en pareja?





ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:

### País de origen




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009




## DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

### Nivel de estudios



■ HAYA

■ IVE España 2007




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

### Nivel de estudios



\* Variables dependientes




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

### Situación laboral





ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



# DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

## Nivel de estudios



■ España  
■ Otro país

\* Variables dependientes




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## HÁBITOS ANTICONCEPTIVOS


“En el momento de este embarazo, ¿estaba utilizando algún método?”



n=2475

No □ Sí ■

Un 36,2% dicen NO utilizar método




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



# HÁBITOS ANTICONCEPTIVOS

## Tipo de Método Anticonceptivo Usado




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## HÁBITOS ANTICONCEPTIVOS

### Motivo del fallo del preservativo



**Mal uso:** alternancia con métodos naturales, mala utilización o no utilización

**Incidencia:** rotura, permanencia en vagina, se arrugo y se salió

¿Utilizaba correctamente el preservativo?		
	N	%
Siempre	281	28,8%
Casi siempre	504	51,6%
Ocasionalmente	180	18,4%
Nunca	3	0,3%
Ns/Nc	9	0,9%
Total	977	100,0%

**UN 70% DE LAS USUARIAS DE PRESERVATIVO LO HACIA DE FORMA INCONSISTENTE**

Base: Utilizaban preservativo masculino, 977 mujeres


n=977



ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## HÁBITOS ANTICONCEPTIVOS



Mal uso: Olvido, confusión o retraso en la toma, descanso, inicio inadecuado del tratamiento


Incidencia: Alteraciones gastrointestinales tras la toma, uso de fármacos con interacciones



ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## HÁBITOS ANTICONCEPTIVOS




ESTUDIO HAYA  
Reunión Investigadores Enero 2009



## Píldora postcoital

¿En alguna ocasión ha utilizado la píldora postcoital?



En esta ocasión 9 de cada 10 mujeres no han recurrido a la píldora postcoital

## Conclusiones

- La mujer que acude a IVE es en un **58% de los casos española**, y entre la población inmigrante son mayoritariamente de nacionalidad rumana, ecuatoriana y boliviana. Estas mujeres son en la mayoría de los **casos solteras, con una edad comprendida entre los 20 y 30 años**, un 36% no son usuarias de métodos anticonceptivos, tienen estudios medios y trabajan fuera del hogar.
- El 73% de las mujeres españolas que acudieron a IVE población española utilizaban método anticonceptivo frente al 50% de la población inmigrante.
- Hay un elevado porcentaje de **mal uso** del método anticonceptivo



## Conclusiones

- El estudio no permite hacer cálculos de utilización, cumplimiento y eficacia, pero sugiere:
  - **Los métodos que afectan la espontaneidad de la relación** (preservativo, métodos naturales, *c.interruptus*) tienen un mayor índice de uso inadecuado.
  - Los **AHC** (píldora, anillo y parche) presentan un índice de uso inadecuado intermedio y similar.
  - Los métodos a **largo plazo e irreversibles**, bajo índice de uso inadecuado.
- El **doble método** se plantea como una alternativa en los grupos poblacionales más propensos al mal uso del preservativo
- Siguen siendo **necesarias las campañas de formación e información sobre métodos anticonceptivos**, así como una mayor implicación de los estamentos institucionales, para la mejora de la asistencia y la educación y accesibilidad en materia de sexualidad y anticoncepción.

